

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53	УП-10-107		
Поступак са пацијентом који болује од хепатитиса Б или Ц, ХИВ - а или туберкулозе, а над којима се изводи оперативни захват				
Страна 1 од 3	Издање: 2	Важи од: 2022-01-21	Одобрио Проф. др Златко Максимовић	Копија број Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством се регулише поступак са пацијентима који болују од ХИВ - а, хепатитиса Б (у даљем тексту ХБВ) и хепатитиса Ц (у даљем тексту ХЦВ) или туберкулозе (у даљем тексту ТБЦ), а над којима треба да буде изведен оперативни захват у амбулантама или Операционом блоку са централном стерилизацијом у Јавно здравственој установи Болница „Свети Врачеви“ Бијељина (у даљем тексту Болница Бијељина).

1.2 Подручје примјене

Ово упутство се примјењује у Операционом блоку са централном стерилизацијом, ургентном блоку, Одсјеку за акушерство и свим специјалистичким амбулантама у којима се изводе оперативни захвати.

1.3 Надлежности за примјену

За примјену овог упутства надлежан је директор Болнице Бијељина.

1.4 Искључења

- Нема.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

- Стандарди за сертификацију и акредитацију за болнице.

2.2 Остали документи

- УП-10-117: Упутство о раду операционог блока.

- ПР-10-028: Поступак управљања медицинским отпадом.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

- Нема.

3.2 Скраћенице

- Нема.

4. ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА)

4.1 Операција на пацијенту који је носилац ХИВ, ХБВ или ХЦВ

4.1.1 Прије операције / процедуре:

- Особље које учествује у њези, дијагностици и лијечењу болесника мора бити упознато да је пацијент носилац крвнопрениосивих болести.
- На температурној листи мора бити видно истакнуто упозорење(ХБВ, ХЦВ или ХИВ).
- Све процедуре које су повезане са крвнопрениосивим болестима морају бити пажљиво извођене уз кориштење заштитне опреме (рукавице, маска, наочаре и др...).
- Операцију ризичног (ХИВ, ХБВ или ХЦВ), пацијента планирати за крај оперативног програма, ако то није могуће онда треба планирати довољно времена да се након

Болница Бијељина	Страна 2 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-107
		2	2022-01-21	

завршеног оперативног захвата операционе сале, инструменти, опрема и др. темељно очисте и дезинфикују.

- Прије него што се почне са извођењем операције, потребно је одстранити сву у опрему која није неопходна за извођење конкретне операције.
- Користити опрему, веш, прикључке и сл. за једнократну употребу (кад год то услови дозвољавају).
- Операциони сто и сто за инструменте прекрити непромочивим прекривачем, који ће се након операције лако одстранити и бацити.

4.1.2 Током операције:

- Током операције особље мора да носи заштитне наочаре и каљаче. Стављају се двоје хируршке рукавице. Заштитни мантили би требали да буду за једнократну употребу.
- Кретање у операционој сали треба да буде ограничено само за особље које је директно укључено у конкретну операцију.
- Поступање са оштрим инструментима мора да буде крајње пажљиво. Избјегавати контакт руку са ткивом пацијента, у раду више користити инструменте.
- Избјегавати прскање крви и тјелесних течности.
- Узете узорке ткива за ПХ анализу спаковати у посуде и обавезно означити „Инфективно – ХИВ, ХБВ, или ХЦВ“. Затим посуду спаковати у жуту пластичну кесу и одмах однијети у лабораторију. Помоћна инструментарка телефонским путем обавјештава запослене у Служби за патолошку анатомију са цитолошком дијагностиком о достављању инфективног материјала.
- У случају повреде особља које је изводило операцију поступа се по УП-10-117: *Унутство о раду операционог блока.*

4.1.3 После операције:

- Спремачице које чисте операциону салу морају бити упознате да је претходно учињена операција на болеснику који болује од крвнопреносивих болести.
- Сав отпад из операционе сале се третира као инфективни и пакује се у засебне жуте кесе на којима је постављена наљепница „ИНФЕКТИВНО“, које се одмах износе из операционог блока у за то предвиђену просторију, а у складу са процедуром ПР-10-028: *Поступак управљања медицинским отпадом.*
- Кориштени инструменти се односе у просторију за нечисто (просторија у централној стерилизацији), гдје се потапају у раствор дезинфекционог средства (који се припрема по упутству произвођача) и стоје потопљени 30 минута. Након тога се перу у машини за прање инструмената (сами). После завршеног машинског прања ови инструменти се третирају као и сви други.
- Анестезиолошка опрема која је кориштена (цријева, манжетне за мјерење притиска, каблови и сл.), мора бити очишћена и дезинфикована.
- Обавезно урадити дезинфекцију подова и незаштићених површина, а након тога спровести уобичајено чишћење сале.

4.2 Соба за буђење

Третман са пацијентом у соби за буђење је уобичајен с тим да особље мора бити упознато са чињеницом да је пацијент носилац конкретне болести и да се предузму све неопходне превентивне мјере.

4.3 Операција на пацијенту који болује од ТБЦ

- Оперативне процедуре на болесницима који болују од активне туберкулозе треба одложити ако је то могуће до периода када нису инфективни.

Болница Бијељина	Страна 3 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-107
		2	2022-01-21	

- Уколико се операција не може одложити онда је треба планирати за крај радног времена.
- Особље које долази у контакт са болесником треба бити упозорено да са ради о болеснику са активном ТБЦ и мора да носи протективне маске N95.
- Болесници током транспорта у операциону салу треба да носи заштитну маску, а уколико болује од мултирезистентне ТБЦ заштитну маску N95. Вријеме транспорта мора да буде што краће, без непотребног задржавања, а на том путу не смију се задржавити непотребне особе.
- Оперативни захват се мора извести у најближој операционој сали, без задржавања у премедијацији, него пацијента одмах увести у операциону салу.
- Ако се користи општа анестезија онда се у инспираторни и експираторни систем постављају антибактеријски филтери.
- Улазак непотребним особама у операциону салу је забрањен, а такође је забрањен неоправдан излазак из операционе сале.
- Уколико се постављају торакални дренажи, они морају бити затвореног типа.
- Након завршене операције, операциона сала се мора деконтаминирати дезинфекционим средством које има анти - ТБЦ активност. Операциона сала се може користити поново тек наредног дана.
- Постоперативно буђење пацијента се обавља одвојено од других болесника у просторији за изолацију, уз обезбјеђен мониторинг.

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

5.1 Прилози

- Нема.

5.2 Обрасци

- Нема.

Бијељина