

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске Војске 53			ПР-10-039
Дојење код ХИВ позитивних породиља				
Страна 1 од 2	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	3	2025-01-27	Прим. др Ружица Боровић, начелник одјељења	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет процедуре

Овом процедуром се дефинише поступак организовања услова за дојење новорођенчади у складу са Акредитационим стандардима „Болнице пријатељ беба“.

1.2 Подручје примјене

Ова процедура се примјењује на Одјељењу за гинекологију и акушерство и Одјељењу за педијатрију ЈЗУ Болнице „Свети Врачеви“ Бијељина (у даљем тексту Болница Бијељина).

1.3 Надлежности за примјену

За досљедну примјену надлежан је начелник Одјељења за педијатрију и шеф неонатолошког одсијека, а процедуру морају познавати и спроводити сва лица која учествују у исхрани новорођенчади.

1.4 Искључења

- Нема.

2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтна документа

- Акредитациони стандарди за „Болнице пријатеље беба“.
- Политика о доброј пракси дојења.
- Уницеф/Приручник за мајке о здрављу и дојењу–Институт за јавно здавље РС).

2.2 Остали документи

- Нема.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

- Нема.

3.2 Скраћенице

- Нема.

4. ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА)

4.1 Поступак

Један од могућих начина пренооса вируса ХИВ-а, односно инфекције овим вирусом је и мајчино млијеко, јер се вирус излучује кроз колострум. Процјењује се да је ризик за трансмисију, 16-30%. Због тога се препоручује да ХИВ-позитивне мајке не доје своје новорођенче (извор препорука: Уницеф, *Приручник за мајке о здрављу и дојењу–Институт за јавно здавље РС*).

Болница Бијељина	Страна 2 од 2	Издање:	Важи од:	ПР-10-039
		3	2025-01-23	

Са мајком је неопходно обавити разговор и детаљно је информисати о природи болести, као и о потенцијалним ризицима инфекције код бебе. У процесу информисања мајке активно учествују следећи стручњаци: неонатолог, педијатар у породицишту, инфектолог и гинеколог који прати трудницу код које је потврђена ХИВ инфекција. Неопходно је да се о пријему труднице обавијесте сви наведени учесници у процесу информисања и едукације како би се правовремено предузеле све потребне мјере.

Праћење новорођенчета током боравка у породицишту захтијева надзор у смислу праћења активности болести (консултација са инфектологом, праћење PCR-а и вирусолошких параметра), као и праћење основних лабораторијских параметра (ККС, ЦРП, АБС, гликемија). Новорођенчад ХИВ-позитивних мајки могу да добију Хепатитис Б, док се примјена БЦГ вакцине одлаже.

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

- Нема.

